

Chraňte sebe i svoji rodinu

Vybrané možnosti očkování v rámci povinného a nepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku.



	POVINNÁ OČKOVÁNÍ	NEPOVINNÁ HRAZENÁ OČKOVÁNÍ	NEPOVINNÁ NEHRAZENÁ OČKOVÁNÍ
6. TÝDNŮ			Rotarix Rotaviry 1. dávka vakcíny Rotarix podávána ústy, od 6 týdne věku
9. TÝDEN	Infanrix hexa HEXAVAKCÍNA 1. dávka	BEXSERO Meningokok B 1. dávka vakcíny Bexsero. Nově plně hrazená ZP+	
3. MĚSÍC		Synflorix Pneumokok 1. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP*	Rotarix Rotaviry 2. dávka vakcíny Rotarix podávána ústy, do 24. týdne věku. Min. odstup mezi dávkami jsou 4 týdny
4. MĚSÍC	Infanrix hexa HEXAVAKCÍNA 2. dávka	BEXSERO Meningokok B 2. dávka vakcíny Bexsero. Nově plně hrazená ZP+	
5. MĚSÍC		Synflorix Pneumokok 2. dávka vakcíny Synflorix plně hrazena ZP*	
11. - 13. MĚSÍC	Infanrix hexa HEXAVAKCÍNA Přeočkování		
12. - 15. MĚSÍC		Synflorix Pneumokok Přeočkování vakcínou Synflorix plně hrazeno ZP*	BEXSERO Meningokok B Přeočkování vakcínou Bexsero. Nově plně hrazeno ZP+

+Vakcína Bexsero je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do konce 12. měsíce věku dítěte nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v zákoně, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

*Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce.

*Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3+1.

Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa, Rotarix a Synflorix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa a Synflorix se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Vakcína Rotarix se podává ústy.

O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkováných.

Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B. Infanrix hexa je vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (adsorbovaná). Synflorix je vakcína proti vybraným častým a